

# Иммунал®

(echinacea | эхинацеи сок)

**Регистрационный номер** П N013458/01-26.11.07

**Торговое название**

Иммунал® / Immunal®

**Лекарственная форма**

Раствор для приема внутрь

**Состав**

1 мл раствора для приема внутрь содержит

*активное вещество:* эхинацеи пурпурной травы (*Echinacea purpurea (L.) Moench*) сок - 0,80 мл;

*вспомогательные вещества:* этанол, сорбитол.

**Описание**

От прозрачного до мутного раствор коричневого цвета. В процессе хранения допустимо образование хлопьевидного осадка.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.

Код АТХ: L03AX

**Фармакологическое действие**

*Иммунал является иммуностимулирующим препаратом, изготовленным из лекарственного растительного сырья.*

Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea (L.) Moench*) содержит активные вещества, усиливающие естественные защитные силы организма и действующие в качестве стимуляторов иммунитета. Повышая число лейкоцитов (гранулоцитов) и активизируя фагоцитоз, действующие вещества препарата подавляют размножение микроорганизмов в организме человека и способствуют уничтожению болезнетворных бактерий. Кроме того, установлено противовирусное действие травы эхинацеи пурпурной в отношении возбудителей гриппа и герпеса.

**Показания к применению**

Иммунал® рекомендуется применять для укрепления иммунитета у пациентов с неосложненными острыми инфекционными заболеваниями, предрасположенностью к частым простудам, для профилактики простудных заболеваний и гриппа, а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

**Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных;
- прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, такие, как туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, СПИД или ВИЧ-инфекция;
- детский возраст до 1 года.

**Беременность и период лактации**

Данные о негативном воздействии Иммунала отсутствуют.

Перед применением препарата при беременности и в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

**Способ применения и дозы**

Внутрь.

Для облегчения правильного дозирования в каждую упаковку вложена градуированная дозировочная пипетка. Перед приемом нужное количество препарата следует развести в небольшом объеме воды.

*Взрослым и подросткам старше 12 лет:* по 2,5 мл раствора для приема внутрь 3 раза в день.

*Детям в возрасте от 6 до 12 лет:* по 1,5 мл раствора для приема внутрь 3 раза в день.

*Детям в возрасте от 1 года до 6 лет:* по 1,0 мл раствора для приема внутрь 3 раза в день.

Для достижения терапевтического эффекта Иммунал® следует принимать не менее 1 недели.  
Продолжительность непрерывного курса лечения не должна превышать 8 недель.

#### **Побочное действие**

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности, проявляющихся в виде кожной сыпи, зуда, отека лица, одышки, головокружения, снижения артериального давления.

#### **Передозировка**

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Раствор для приема внутрь Иммунал® содержит спирт, в связи с чем препарат может усиливать или изменять эффект других лекарств. Клинически значимые взаимодействия отмечены при одновременном применении с одним из следующих пяти производных цефалоспоринов (цефамандол, цефотетан, цефменоксим, цефаперазон и моксалактам) и алкоголя (даже в небольших количествах). Реакция пациента характеризовалась покраснением лица, тошнотой, потливостью, головной болью и учащенным сердцебиением. В связи с этим Иммунал® раствор для приема внутрь не следует применять при лечении больного указанными антибиотиками. Прием Иммунала® разрешен лишь спустя трое суток после окончания курса лечения вышеприведенными производными цефалоспоринов.

#### **Особые указания**

При хранении допустимо выпадение хлопьевидного осадка, состоящего из активных полисахаридов.  
Перед употреблением тщательно встряхнуть флакон.

#### **Влияние на способность к концентрации внимания**

При приеме препарата в рекомендованных дозах не требуется специальных предосторожностей.

#### **Форма выпуска**

Раствор для приема внутрь, по 50 мл препарата во флаконе темного стекла, по 1 флакону в комплекте с дозировочной пипеткой и инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности,

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

#### **Производитель**

Лек д.д.

Веровшкова 57, Любляна, Словения.

Претензии потребителей направлять в Представительство в РФ:  
119002, Москва, Староконюшенный пер., д.10/10, стр.1