

Владелец регистрационного удостоверения: PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS, GmbH (Германия)

Произведено: SOLVAY PHARMACEUTICALS, GmbH (Германия)

Код АТХ: A09AA02 (Multienzymes (lipase, protease etc.))

Активные вещества

- панкреатин (pancreatin) *BAN принятое к употреблению в Великобритании*
- диметикон (dimeticone) *Rec.INN зарегистрированное ВОЗ*

Лекарственная форма

ПАНКРЕОФЛАТ® таб., покр. оболочкой, 170 мг+80 мг: 25, 50, 100 или 200 шт.
рег. №: П №013351/01 от 10.05.07 - *Срок действия рег. уд. не ограничен*

Форма выпуска, состав и упаковка

Таблетки, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, продолговатой формы.

	1 таб.
панкреатин	170 мг,
с ферментативной активностью:	
протеолитической	400 Ед Евр. Ф.
амилолитической	5500 Ед Евр. Ф.
липолитической	6500 Ед Евр. Ф.
диметикон	80 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, сорбиновая кислота, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, сухого молока порошок, гипромеллоза, акации камедь, коповидон К 28.

Состав оболочки: акации камедь, коповидон К 28, магния оксид (легкий), кремния диоксид коллоидный, повидон, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид (Е171), макрогол 6000, натрия кармеллоза 2000, капол 1295 (пчелиный воск, карнаубский воск).

25 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

25 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

25 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

25 шт. - блистеры (8) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Ферментный препарат с компонентом, уменьшающим метеоризм

Фармако-терапевтическая группа: Пищеварительное ферментное средство

Показания

— нарушение функции поджелудочной железы (недостаточность внешнесекреторной функции), например, хронические панкреатиты и ахилия желудка;

— нарушения пищеварения в случае заболеваний печени и желчевыводящих путей;

— нарушение пищеварения после операций на желудке и тонкой кишке, особенно, если эти заболевания связаны с повышенным газообразованием и скоплением газов в кишечнике (метеоризм).

Режим дозирования

Препарат принимают внутрь, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости, во время или после еды.

Взрослым назначают по 1-2 таб. с каждым приемом пищи.

Детям в возрасте 12 лет и старше режим дозирования устанавливают индивидуально.

Продолжительность курса лечения определяется лечащим врачом.

Побочное действие

Дерматологические реакции: возможны аллергические реакции (в случае непереносимости какого-либо компонента препарата).

Со стороны пищеварительной системы: боли в животе, дискомфорт в области желудка, запор, диарея, тошнота, рвота, гиперурикозурия, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови.

Противопоказания к применению

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью препарат следует назначать на ранних стадиях острого панкреатита и при обострении хронического, а также при непереносимости галактозы, лактазной недостаточности и нарушениях всасывания глюкозы-галактозы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о токсическом действии на репродуктивную функцию и развитие плода нет.

Однако поскольку безопасность применения препарата Панкреофлат при беременности и в период лактации изучена недостаточно, следует соблюдать осторожность при его назначении.

Применение при нарушениях функции печени

Возможно использование по показаниям

Применение у детей

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

Передозировка

Данных о случаях передозировки препарата Панкреофлат нет.

Лекарственное взаимодействие

Одновременное применение антацидных препаратов, содержащих магния карбонат и/или алюминия гидроксид, может привести к снижению эффективности диметикона.

Не было отмечено клинически значимого взаимодействия панкреатина с другими лекарственными средствами.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 20°C. Срок годности – 2 года.