

Наименование: Релиф (Relief)

Фармакологическое действие:

Релиф – противогеморройное средство. Масло печени акулы обладает местным гемостатическим, противовоспалительным, иммуномодулирующим и ранозаживляющим эффектами. Фенилэфрина гидрохлорид – сосудосуживающее средство из группы адреномиметиков. При местном применении уменьшает просвет сосудов, что нормализует соотношение между кровенаполнением геморроидальной ткани и оттоком от геморроидальных узлов. Благодаря этому действию снижаются зуд, отечность, серозные выделения и экссудативные явления при геморрое и заболеваниях аноректальной зоны.

Основой для суппозиториев является масло какао; мази - кукурузное и минеральное масла, витамин Е, масло чабреца, глицерин, - безопасные компоненты, обладающие смягчающим эффектом.

Показания к применению:

- Наружный, внутренний геморрой;
- анальная трещина;
- микротравмы или эрозии ануса;
- анальный зуд.

Поскольку препарат обладает успокаивающим, ранозаживляющим, противовоспалительным, кровоостанавливающим действием, может применяться как симптоматическое средство при жжении, зуде и дискомфорте, которые сопровождают другие заболевания прямой кишки и перианальной области.

Способ применения:

Релиф в любой форме выпуска использовать только после гигиенического туалета перианальной зоны. Облегчение признаков геморроя (или другого заболевания) и стойкий терапевтический эффект развивается при регулярном использовании препарата.

Релиф мазь

Смазать прилагаемый аппликатор небольшим количеством мази, нанести внутрь ануса или на пораженные участки перианальной области. Режим применения: до 4 раз в сутки (рекомендуется нанесение утром, вечером и после каждой дефекации). После каждого нанесения аппликатор необходимо промыть теплой водой и поместить внутрь защитного колпачка.

Релиф суппозитории

Вводят в заднепроходное отверстие после извлечения из контурной оболочки. Режим дозирования: по 1 суппозиторию до 4 р/сутки (рекомендуется ректальное введение утром, вечером и после каждой дефекации).

Регулярное использование препарата обеспечивает стойкий терапевтический эффект, облегчает симптомы геморроя.

Побочные действия:

Склонность к гиперкоагуляции при значительном превышении рекомендуемой дозировки.

Противопоказания:

- Гранулоцитопения;
- тромбоэмболическая болезнь;
- индивидуальная гиперчувствительность к компонентам Релифа.

Беременность:

Во время беременности и кормления грудью применять только по рекомендации врача при наличии строгих показаний.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется назначать пациентам, принимающим ингибиторы моноаминооксидазы, антигипертензивные средства и антидепрессанты без постоянного врачебного наблюдения. Таким категориям больных Релиф назначается только по строгим показаниям.

Передозировка:

Случаи передозировки неизвестны. Данных о токсических или системных действиях препарата при ректальном введении не известны.

Форма выпуска:

Мазь Релиф – мазь ректальная в тубе 28,4 г. Картонная коробка содержит тубу и аппликатор (1 шт.)
Суппозитории Релиф – суппозитории ректальные, в контурной ячейковой оболочке – 12 шт.

Условия хранения:

При температуре не выше 27°C в темном месте.

Состав:

Мазь Релиф

Активные компоненты (в 1 г): фенилэфрина гидрохлорид (2,5 мг), масло печени акулы (30 мг).
Вспомогательные компоненты: витамин Е, минеральное масло, масло тимьяна (чабреца), кукурузное масло, глицерин, вазелин, пропилпарабен, метилпарабен, безводный ланолин, кислота бензойная, парафин, спирт ланолиновый, вода очищенная, белый воск.

Суппозитории Релиф

Активные компоненты: фенилэфрина гидрохлорид (0,25%), масло печени акулы (3%).
Вспомогательные компоненты: какао масло, пропилпарагидроксибензоат (Е 216), метилпарагидроксибензоат (Е218), кукурузный крахмал.

Нозологическая классификация (МКБ-10):

Геморрой (I84)

Дополнительно:

Возможность применения Релифа необходимо согласовать с врачом, если пациент страдает: выраженной гипертонией, тиреотоксикозом, нарушениями сердечного ритма тяжелой степени, нарушении мочеиспускания. Необходима консультация врача, если на фоне применения Релифа после 7 дней от начала терапии сохраняются значительные кровянистые выделения из заднепроходного отверстия или симптомы болезни не купируются.

При повреждении или отсутствии контурной пластиковой оболочки Релиф не применять.

В педиатрии детям до 12 лет назначение препарата возможно только по строгим показаниям.