

ФАРИНГОСЕПТ®

Регистрационный номер:

П № 015365/01

Торговое название: ФАРИНГОСЕПТ

Международное непатентованное название (МНН): амбазон

Лекарственная форма:

таблетки для рассасывания;

таблетки для рассасывания со вкусом лимона

Химическое название: бензохинон-гуанилгидразон-тиосемикарбазон

Состав:

Каждая таблетка:

Активное вещество: амбазона моногидрата 10 мг

Вспомогательные вещества: какао, сахар (сахароза), лактоза моногидрат, гуммиарабик, поливидон К30, магния стеарат, ванилин или ароматизатор лимонный.

Описание:

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона:

Круглые, плоские, скошенные к краю таблетки желтовато-коричневого цвета с цельными краями, с гравировкой «L» с одной стороны. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептическое средство.

Код АТХ [R02AAA01]

Фармакологическое действие

Обладает бактериостатическим действием. Оказывает местное противомикробное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (*Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans*, *Pneumococcus*).

Фармакокинетика.

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3-4 день приема препарата при дозе 0,03-0,05 г/сут.

Показания к применению

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15-30 минут после еды).

После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи.

Взрослым: по 4-5 таблеток г (0,04-0,05) в сутки.

Детям: от 3 до 7 лет 3 таблетки (0,03 г) в сутки. Курс лечения 3-4 дня.

Побочное действие:

Аллергические реакции, кожная сыпь.

Особые указания:

Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания 10 мг.

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона 10 мг.

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и коричневой, матовой ПВХ пленки.

По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Для препарата расфасованного и упакованного в России на ОАО «АКРИХИН»:

Таблетки для рассасывания 10 мг

По 10 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной коричневой матовой импортной, фирмы «Klockner pentaplast» (Германия) и фольги алюминиевой печатной лакированной по ТУ 48-21-270-94 или ГОСТ 745-2003, или импортной, соответствующей требованиям ГОСТ 745-2003.

По 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац по ГОСТ 7933-89.

Условия хранения

При температуре не выше +25° С, в недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года

Препарат нельзя использовать позже указанной на упаковке даты.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта .

Название и адрес изготовителя

«Ранбакси Лабораториз Лимитед»

С.К. ТЕРАПИЯ С.А. 124 Фабричи ул., Клуж-Напока, Румыния

Ranbaxy Laboratorii Limited manufactured by S.C. Terapia S.A. 124 Fabricii Street, Cluj-Napoca, Romania

Претензии потребителей направлять в представительство компании "Ранбакси

Лабораториз Лимитед" по адресу:

129223 Москва, пр. Мира, ВВЦ, Деловой Центр

«Технопарк», стр. 537/4, офис 45-48.