

# ЛЕВОМЕКОЛЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОТЗЫВЫ

Клинико-фармакологическая группа

Форма выпуска, состав и упаковка

Фармакологическое действие

Дозировка

Побочные действия

Условия и сроки хранения

Показания

Противопоказания

Условия отпуска из аптек

## АНАЛОГИ

ЛЕВОМЕТИЛ, мазь

НЕТРАН, мазь

### Клинико-фармакологическая группа

Препарат с антибактериальным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения

### Форма выпуска, состав и упаковка

◇ Мазь для наружного применения	1 г
хлорамфеникол	7.5 мг
метилурацил	40 мг

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

100 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

1000 г - банки темного стекла (1) - бумага оберточная.

### Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее)

и **противомикробное** действие, *активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов* (стафилококков, синегнойной и кишечной палочек). Легко проникает в глубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации. В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

### Дозировка

Наружно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36°С. перевязки производят ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

## **Побочные действия**

*Возможны* местные аллергические реакции.

## **Условия и сроки хранения**

Срок годности - 3.5 года. Не использовать препарат по истечении срока годности.

## **Показания**

— гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

## **Противопоказания**

— гиперчувствительность.

## **Условия отпуска из аптек**

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.