

ВАЛОСЕРДИН®

Регистрационный номер:

P N000624/01

Торговое название препарата: Валосердин®

Лекарственная форма:

капли для приема внутрь

Состав

Фенобарбитала	- 2,0 г
Этилового эфира α-бромизовалериановой кислоты (этилбромизовалерианат)	- 2,0 г
Вспомогательные вещества:	
Мяты перечной масла	- 0,14 г
Испанского хмелевого масла (масло душицы)	- 0,02 г
Спирта этилового ректифицированного 96 % (этанол)	- 52,0 г
Воды очищенной	до 100,0 г

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим ароматическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

седативное средство.

Код АТХ N05CM

Фармакологические свойства

Комбинированное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами компонентов, входящих в его состав.

Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектами. Способствует снижению возбуждения центральной нервной системы и облегчает наступление естественного сна.

Этилбромизовалерианат оказывает также седативное и спазмолитическое действие. Масло мяты перечной обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

Показания к применению

Валосердин назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, при невротических состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, нарушенном засыпании, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; выраженные нарушения функции почек и/или печени, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Валосердин принимают внутрь, до еды, с небольшим количеством жидкости.

Дозировка устанавливается индивидуально.

Взрослым назначают обычно по 15-20 капель 3 раза в день до еды. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 40-50 капель.

Детям назначают из расчета 1 капля на год жизни ребенка и в зависимости от клинической картины заболевания.

Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Побочное действие

Валосердин, как правило, хорошо переносится даже при длительном применении. В отдельных случаях, в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение.

При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит,

геморрагический диатез, нарушение координации движений.

При проявлении каких либо побочных (необычных) эффектов, не отраженных в инструкции, необходимо сообщить о них лечащему врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении Валосердина с седативными средствами - усиление эффекта.

Одновременное применение с нейролептиками и транквилизаторами усиливает, а со стимуляторами центральной нервной системы - ослабляет действие каждого из компонентов препарата. Алкоголь усиливает эффекты Валосердина и может повышать его токсичность. Наличие в составе фенобарбитала может индуцировать ферменты печени, и это делает нежелательным его одновременное применение с препаратами, которые метаболизируются в печени, поскольку их концентрация, а соответственно эффективность будет снижаться в результате более ускоренного метаболизма (непрямые антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды и др.)

Фенобарбитал ослабляет действие производных кумарина, глюкокортикостероидов, гризеофульвина, контрацептивных средств для приема внутрь.

Валосердин может повышать токсичность метотрексата.

Передозировка

Симптомы.

При легкой и среднетяжелой интоксикации наблюдается сонливость, головокружение, психомоторные нарушения.

В тяжелых случаях - кома, снижение артериального давления, нарушение дыхания, тахикардия, сосудистый коллапс, снижение периферических рефлексов.

Лечение: промыть желудок, принять активированный уголь и вызвать врача.

Особые указания

При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Препарат содержит 55 объемных % этанола и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Валосердин, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующих быстроты психических и двигательных реакций.

При длительном применении препарата возможно формирование лекарственной зависимости; возможно накопление брома в организме и развитие отравления им.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 15, 25 мл или 50 мл во флаконы - капельницы оранжевого стекла, или по 50мл во флаконы оранжевого стекла.

Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при комнатной температуре.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

125239, Москва, Фармацевтический проезд, 1 тел.

Претензии по качеству препарата направлять в адрес производителя:

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

125239. Москва. Фармацевтический проезд, 1.