

Инструкция к лекарству "ЛИОТОН 1000"

Общая информация:

Название

ЛИОТОН® 1000

Латинское название

LIOTON® 1000

Действующие вещества

> гепарин натрия

Форма выпуска

◇ **Гель для наружного применения** бесцветный или со слегка желтоватым оттенком, почти прозрачный, вязкой консистенции.

	100 г
гепарин натрия	100 000 МЕ

[PRING] метилпарагидроксибензоат - 0.12 г, пропилпарагидроксибензоат - 0.03 г, карбомер 940 - 1.25 г, этиловый спирт 96% (этанол) - 30 мл, неролиевое масло - 0.05 г, лавандовое масло - 0.05 г, триэтаноламин (троламин) - 0.85 г, вода очищенная - до 100 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Условие отпуска из аптеки

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.
Срок годности - 5 лет.

Способ применения и дозы

На кожу в области поражения наносят 3-10 см геля 1-3 раза/сут и осторожно втирают.

Показания

— тромбозы поверхностных вен, флеботромбоз;

- осложнения после хирургических операций на венах;
- локализованные инфильтраты и отеки;
- травмы, ушибы (в т.ч. мышечной ткани, сухожилий, суставов);
- подкожные гематомы.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к гепарину.

Использование при беременности

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по строгим показаниям.

Передозировка

В связи с малой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие Лиотона 1000 не описано.

Особые указания

Препарат не следует применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, на слизистых оболочках и при гнойных процессах.

С осторожностью применяют Лиотон 1000 при повышенной кровоточивости.